

TILOCEN-20

Κτηνιατρικό ενέσιμο αντιβιοτικό για ενδομυϊκή ή υποδόρια χορήγηση

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η τυλοζίνη είναι αντιβιοτικό της ομάδας των μακρολιδίων και προέρχεται από την ζύμωση ενός μύκητα που μοιάζει με τον ακτινομύκητα STREPT. FRADIAE. Η τυλοζίνη έχει βακτηριοστατική ενέργεια που, θα δεστά στην ικανότητά της να αναστέλλει την βακτηριακή πρωτεΐνηκή σύνθεση. Είναι δραστική κυρίως επί των βετικών κατά GRAM μικροοργανισμών, επί ορισμένων αρνητικών (σπεριοχατίνων, ομάδας χλαυδιών) και επί των μυκοπλασμάτων (PPLO). Αμέως μετά την παρεντερική χορήγηση του του TILOCEN-20 απορροφάται πλήρως και με ταχύ ρυθμό και διανέμεται ευρέως σε όλα τα υγρά και τους ιστούς του οργανισμού. Μετά τον διομετασχηματισμό του το TILOCEN-20 απεκκρίνεται κυρίως από τη χολή, τα ώρμα και το γάλα. Το φάρμακο αυτό είναι εξαιρετικά ασφαλές επειδή έχει πολύ χαμηλή τοξικότητα.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Κάθε μίλ διαλύματος TILOCEN-20 περιέχει ταρταρική τυλοζίνη, ισοδύναμη με τυλοζίνη βάση 200 mg. Έκδοχα Q.S. AD I ML.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΩΠΑΝ

ΧΟΙΡΟΙ: Δισεντερία, ερυθρά, ενζυμοτική πνευμονία, συνδυασμένη μπριτίδα-μαστίδα, αρθρίτιδα και γενική σε μικροοργανισμούς ευαισθήσεως στην τυλοζίνη.

ΒΟΟΕΙΔΗ: Πνευμονία, εντερίτιδα, σήψη πελμάτων, μητρίτιδα, δι-φθερίτιδα μόσχων.

ΑΙΓΑΠΟΡΩΒΑΤΑ: Λαιμώδης αγαλαξία στο αρχικό της στάδιο, σπηγή οξεία μορφή της, πλευροπνευμονία, σπηγή πελμάτων, μητρίτιδα, αποθολή.

ΣΚΥΛΑΙ - ΓΑΤΕΣ: Λοιμώξεις των άνω αναπνευστικών οδών, έξω ωτίδα, μητρίτιδα, λεπτοσπειρώση, δευτεροπάθεις βακτηριακές λοιμώξεις συνδυασμένες με ασθένειες από ιούς.

Γενικώς το TILOCEN-20 μπορεί να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των λοιμώξεων των ζώων που προκαλούνται από μικροοργανισμούς ευαισθήτους στο φάρμακο αυτό όπως ο κτηνιατρός επιλέγει την παρεντερική χορήγηση φαρμάκων.

ΑΝΤΕΔΕΙΣΕΙΣ

Το TILOCEN-20 δεν πρέπει να χορηγείται στα ιπποειδή και τα κουνέλια. Δεν πρέπει επίσης να χορηγείται σε ζώα με σοδαρές νεφρικές παθήσεις ή υπερευαισθητά στην τυλοζίνη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε μερικές περιπτώσεις το TILOCEN-20 μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό ή νέκρωση στο σημείο της ένεσης. Περιστασιακά μπορούν να εμφανιστούν επίσης αλλεργικές αντιδράσεις που οφείλονται στην υπερευαισθησία στην τυλοζίνη. Σπανιωτάτα μπορούν να παρουσιαστούν στους χοίρους, στα βοοειδή και στους σκύλους οιδημάτη του βλεννόγανου και πρόπτωση του ορθού, ερυθημα και ελαφρός κνημός του πρωκτού. Η διακοπή της θεραπείας εξαφανίζει τα συμπτώματα αυτά.

Τυχόν υπερδόσοσλαγία μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση, νέκρωση στο σημείο της ένεσης, πεπτικά ενοχλήματα, διάρροια, εμέτο, ανορεξία και ταχυκαρδία. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η αμεση διακοπή της θεραπείας και η προσφυγή στον κτηνιατρό.

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το TILOCEN-20 χορηγείται ενδομυϊκά ή υποδορίως αναλόγως της καπνογρίας των ζώων ως εξής:

ΒΟΟΕΙΔΗ: 4-10 mg ανά κιλό σωματικού βάρους ή 0,2-0,5 ml ανά 10 κιλά σωματικού βάρους την ημέρα ενδομυϊκά επί 3-5 ημέρες. Μην ενιστε περισσότερο των 10 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο (εάν ένα μεγάλο ζώο χρειάζεται π.χ. 30 ml την ημέρα κάνετε 3 ενεσίες των 10 ml η κάθε μία σε διαφορετικό σημείο του σώματος του).

ΧΟΙΡΟΙ: 2-10 mg ανά κιλό σωματικού βάρους ή 0,1-0,5 ml ανά 10 κιλά σωματικού βάρους την ημέρα ενδομυϊκά επί 3-5 ημέρες. Μην ενιστε περισσότερο των 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.

ΑΙΓΑΠΟΡΩΒΑΤΑ: 10 mg ανά κιλό σωματικού βάρους ή 0,5 ml ανά 10 κιλά σωματικού βάρους την ημέρα ενδομυϊκά επί 3-5 ημέρες. Μην ενιστε περισσότερο των 5 ml διαλύματος στο ίδιο σημείο.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή, χοίροι, αιγοπρόβατα: 8 ημέρες για το κρέας, 5 ημέρες για το γάλα.

Σημείο έγχυσης: 21 ημέρες.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Να μην αναμιγνύεται με άλλα διαλύματα γιατί μπορεί να προκληθεί καθίζηση της δραστικής συστασίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Ανακινήστε το φαρμακίδιο προ της χρήσεως. Αποφύγετε την επαφή του φαρμάκου με το δέρμα των χεριών γιατί είναι δυνατή η πρόκληση αλλεργικών αντιδράσεων.