

PANCLOSTIL

Πολυδύναμο εμβόλιο για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων των προβάτων.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το εμβόλιο PANCLOSTIL περιέχει :

-Ανατοξίνη α του Clostridium perfringens τύπος A.....	2 IU/ml
-Ανατοξίνη β του Clostridium perfringens τύπος C.....	10 IU/ml
-Ανατοξίνη ε του Clostridium perfringens τύπος D.....	5 IU/ml
-Ανατοξίνη του Clostridium septicum.....	2,5 IU/ml
-Ανατοξίνη του Clostridium tetani.....	2,5 IU/ml
-Ανακαλλιέργεια του Clostridium chauvoei.....	100% προστασία
-Διάλυμα φορμαλδεύδης (HCHO).....	έως 0,05%
-Υδροξείδιο του αργιλλίου (Al(OH)3).....	0,8-1,0 %

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την πρόληψη των κλωστριδιακών λοιμώξεων :

- Εντεροτοξιναιμία προβάτων.
- Νόσος πολτώδους νεφρού.
- Δυσεντερία αμνών.
- Αιμορραγική εντερίτιδα αμνών.
- Κακόηθες οίδημα ήνυστρου.
- Συμπτωματικός άνθρακας.
- Αεριογόνος γάγγραινα.
- Τέτανος.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν εμβολιάζονται ασθενή και παρασιτούμενα ζώα. Εμβολιάζονται ζώα με καλή υγεία και θρέψη.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το εμβόλιο PANCLOSTIL είναι καλά ανεκτό από τα ζώα που εμβολιάζονται. Μια ελαφρά, παροδική αντίδραση στο σημείο της ένεσης (υποδόριο οίδημα) μπορεί να παρατηρηθεί και είναι φυσιολογική.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Χορηγούνται 2ml του εμβολίου υποδόρια. Επανάληψη μετά 6 εβδομάδες και κάθε χρόνο.

Στα αρνιά συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να γίνεται στην ηλικία των 3 εβδομάδων.

Στις προβατίνες που κυοφορούν συνιστάται ο πρώτος εμβολιασμός να μη γίνεται αργότερα από το 2,5 μήνα της κύησης και η επανάληψη μετά 6 εβδομάδες, αλλά όχι αργότερα από τον 4 μήνα της κύησης.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχει.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ - ΦΥΛΑΞΗ

Το PANCLOSTIL παραμένει σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε σκοτεινό χώρο θερμοκρασίας 4° - 8° C.

ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΑΦΟΥ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΤΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 24 ΩΡΩΝ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ