



# Baytril®

flavour

**Δισκία**  
**15 mg, 50 mg, 150 mg**

Enrofloxacin

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αντιβιοτικά δισκία ενροφλοξακίνης για το σκύλο και τη γάτα

### ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**

D-51368, Leverkusen, Germany

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

**KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH**

Projensdorfer Str. 324

D-24106 Kiel

Germany

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:

**PROVET A.E.**

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Κύπρο:

**ACTIVET LTD**

Τηλ.: 00357 22591918

Fax: 00357 22591917

E-mail: info.activet@cytanet.com.cy

### ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

#### Δραστικό συστατικό:

Κάθε δισκίο Baytril tablets 15 mg περιέχει

15 mg ενροφλοξακίνης

Κάθε δισκίο Baytril tablets 50 mg περιέχει

50 mg ενροφλοξακίνης

Κάθε δισκίο Baytril tablets 150 mg περιέχει

150 mg ενροφλοξακίνης

### Έκδοχα:

Lactose monohydrate

Maize starch

Cellulose microcrystalline (Avicel)

Povidone 25

Magnesium stearate

Silica colloidal anhydrous (Aerosil)

Artificial beef flavour irradiated 65

### ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το BAYTRIL tablets συνιστάται για τη θεραπεία των λοιμώξεων του σκύλου και της γάτας, που οφείλονται στα εξής ευαίσθητα στην ενροφλοξακίνη Gram θετικά και αρνητικά βακτήρια: *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Staphylococcus* spp. και *Klebsiella* spp.

Εξαιτίας της ευρέος φάσματος δραστηριότητάς του το BAYTRIL tablets μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σκύλο και τη γάτα σε οξείες, χρόνιες και υποτροπιάζουσες βακτηριακές λοιμώξεις του πεπτικού, του αναπνευστικού, του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήματος, σε λοιμώξεις του εξω ακουστικού πόρου και του δέρματος (πυώδεις δερματίτιδες).

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται:

- σε σκύλους και γάτες ηλικίας μικρότερης των 12 μηνών ή μέχρι την ηλικία των 18 μηνών, εφόσον πρόκειται για μεγαλόσωμες φυλές σκύλων
- κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας
- όταν υπάρχουν ήδη αλλοιώσεις στους χόνδρους των οστών
- σε ζώα που εμφανίζουν επιληψία ή επιληπτικές κρίσεις

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθούν γαστρεντερικές διαταραχές.

Είναι δυνατό να αναπτυχθούν αλλοιώσεις στις αρθρώσεις.

Αμφιβληστροειδοπάθεια, συμπεριλαμβανομένης της τύφλωσης, μπορεί να εμφανιστεί στη γάτα, όταν υπερβαίνεται η δόση.

Bay

81342113

