

VETRIMOXIN® Long Acting

Ενέσιμο εναιώρημα για βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίρους.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικό συστατικό:

Amoxicillin (as trihydrate).....150 mg

Έκδοχα.....έως.....1 ml

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Θεραπεία λοιμώξεων που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στην αμοξικιλίνη και ιδιαίτερα αναπνευστικών λοιμώξεων.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται:

- σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις πνενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες.
- σε τρωκτικά και λαγόμορφα.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δυνατό να παρατηρηθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας.

Στο σημείο της ένεσης στα βοοειδή σε ποσοστό 10% περίπου είναι δυνατό να παρατηρηθούν διόγκωση και ερυθρές κηλίδες που παρέρχονται γρήγορα και αυτόματα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλείσθε να ενημερώσετε τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Βοοειδή – Πρόβατα – Αίγες – Χοίροι

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγούνται ενδομυικά 15 mg αμοξικιλίνη/kg σ.β. (1ml Vetrinomoxin/10 kg σ.β.).

Επανάληψη μετά 48 ώρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το Vетrimoxin να μην αναμειγνύεται στην ίδια σύριγγα με άλλα προϊόντα όταν χορηγείται στο ζώο.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Βοοειδή:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 16 ημέρες.
Γάλα: 72 ώρες.

Πρόβατα:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 18 ημέρες.
Γάλα: 72 ώρες.

Αίγες:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 22 ημέρες.
Γάλα: 72 ώρες.

Χοίροι:

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 20 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος προστατευμένο από το φως.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της άμεσης συσκευασίας: 28 ημέρες.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση σε ζώα

Η ένεση της επαναληπτικής δόσης μετά 48 ώρες να γίνεται σε διαφορετικό σημείο από αυτό της αρχικής δόσης.

Στα βοοειδή στο ίδιο σημείο να μη χορηγούνται περισσότερα από 20 ml Vетrimoxin.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα

Άτομα υπερευαίσθητα στις πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες να χειρίζονται το προϊόν με ιδιαίτερη προσοχή, αποφεύγοντας την υπερβολική έκθεση σε αυτό.

Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία

Το Vетrimoxin μπορεί να χορηγηθεί σε ζώα που κυοφορούν. Λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή απέκκριση της αμοξικιλίνης με το γάλα, σε ζώα που γαλουχούν είναι δυνατό να χορηγηθεί το Vетrimoxin και το γάλα τους να καταναλωθεί από τα μικρά τους.

Αλληλεπιδράσεις

Να μη χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με βακτηριοστατικά αντιβιοτικά.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κατά τόπον ισχύουσες απαγόρευσης.

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Φαρμακολογικές ιδιότητες

Η αμοξικιλίνη είναι βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό ευρέος φάσματος της οικογένειας των πενικιλλινών. Η βακτηριοκτόνος δράση της οφείλεται στην ιδιότητα της να αναστέλλει τη σύνθεση του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος.

Το φάσμα δράσης της περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό Gram⁺ και Gram⁻ βακτηρίων (όχι, όμως, στελέχη που παράγουν β-λακταμάση), όπως είδη *Staphylococcus*, *Streptococcus*, *Corynebacterium*, *Clostridium*, *Escherichia*, *Klebsiella*, *Shigella*, *Proteus*, *Pasteurella*.

Η φαρμακοκινητική ταυτότητα της αμοξικιλίνης χαρακτηρίζεται από:

- Υψηλή βιοδιαθεσιμότητα μετά από ενδομυική χορήγηση: 97% στα βοοειδή και 80% στους χοίρους.
- Υψηλή διάχυση και υψηλές συγκεντρώσεις στους ιστούς και μικρό βαθμό σύνδεσης με τις πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος.
- Αποβολή με το ούρο σε ποσοστό 80% σε ενεργό μορφή.