

### Προετοιμασία του AURIZON® για χρήση



**1** Αφαιρέστε το πώμα της φιάλης




**2** Αποσπαστείτε τον πλαστικό σωληνίσκο από το ακροφύσιό του



**3** Τοποθετήστε το σωληνίσκο στο στόμαχο της φιάλης

### Τρόπος εφαρμογής του AURIZON®


**5** Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση



**6** Ανασπώνετε το πτερύγιο του αυτιού και τοποθετείστε το σωληνίσκο



**7** Πιέστε ελαφρά τη φιάλη



(αυτί σε τομή)

**8** Το Aurizon θα απελευθερωθεί στον εξω ακουστικό πόρο

**9** Μετά την ενστάλαξη, να γίνουν ελαφρές μαλαξές στη βάση του αυτιού για να ισοκαταμετρηθούν οι σταγόνες.



# Vétoquinol



## AURIZON®

ωτικές σταγόνες, εναιώρημα σε ελακώδη μορφή για σκύλους

**ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ**  
VÉTOQUINOL S.A.

B.P. 189

Magny-Vernois

F-70204 LURE Cedex

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

**1 ml AURIZON περιέχει :**

Δραστικά συστατικά :

Marbofloxacin ..... 3,0 mg

Clotrimazole ..... 10,0 mg

Dexamethasone acetate ..... 1,0 mg

(ισοδύναμη με dexamethasone 0,9 mg)

Είδωχα :

Propyl gallate (E310) ..... 1,0 mg

**ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Θεραπεία των εξω ωτίτιδων βακτηριακής και μυκητιακής προέλευσης-οφελόμενες σε βακτηρία ευαίσθητα στη μαρβοφλοξασίνη και μυκήτες, ιδιαίτερα τον *Malassezia pachydermatis*, ευαίσθητους στην κλοτριμαζόλη. Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν δοκιμών ευαισθησίας.

**ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με διάκριση της τυμπανικής μεμβράνης.

Να μη χρησιμοποιείται σε σκύλους με γνωστή υπερευαίσθησία σε ένα από τα συστατικά του.

Να μη χρησιμοποιείται σε έγκυους ή γαλουχούντες θηλυκούς σκύλους.

**ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Οι συνήθεις ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών μπορεί να παρατηρηθούν μετριοβαλές των βιοχημικών και αιματολογικών παραμέτρων.