

Maximec Horse Paste

ΣΥΝΘΕΣΗ

Το Maximec στοματική πάστα περιέχει Ιβερμεκτίνη 18,7 mg/g με άρωμα μήλου.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Maximec ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρασιτώσεων των αλόγων από νηματώδη ή αρθρόποδα:

Μεγάλοι Στρόγγυλοι

Strongylus vulgaris (ενήλικα και ενδοαρτηριακές προνύμφες τετάρτου σταδίου)

S. edentatus (ενήλικα και ενδοϊστικές προνύμφες τετάρτου σταδίου)

S. equinus (ενήλικα)

Triodontophorus spp. (ενήλικα)

Triodontophorus brevicauda

Triodontophorus serratus

Μικροί Στρόγγυλοι

Ενήλικες και άωρες μορφές (τετάρτου σταδίου προνύμφες) μικρών στρογγύλων ή *Cyathostomes*.

Η ιβερμεκτίνη δεν είναι δραστική κατά των ενδοκυστικών προνυμφικών σταδίων των μικρών στρογγύλων.

Coronocylus spp.

Coronocylus coronatus

Coronocylus labiatus

Coronocylus labratus

Cyathostomum spp.

Cyathostomum catinatum

Cyathostomum pateratum

Cylicocyclus spp.

Cylicocyclus ashworthi

Cylicocyclus elongatus

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus leptostomum

Cylicocyclus nassatus

Cylicostephanus spp.

Cylicostephanus calicatus

Cylicostephanus goldi

Cylicostephanus longibursatus

Cylicostephanus minutus

Cylcodontophorus spp.

Cylcodontophorus bicornatus

Parapoteristomum spp.

Parapoteristomum mettami

Petrovinema spp.

Petrovinema poculatum

Poteristomum spp.

Πνευμονικά παράσιτα (ενήλικα και προνύμφες τετάρτου σταδίου)

Dictyocaulus arnfieldi

Οξύουροι (ενήλικα και προνύμφες τετάρτου σταδίου)

Oxyuris equi

Ασκαρίδες (ενήλικα και τρίτου & τετάρτου σταδίου προνύμφες)

Parascaris equorum

Τριχοστρόγγυλοι (ενήλικα)

Trichostrongylus axei

Habronema (ενήλικα)

Habronema muscae

Μικροφιλάριες

Onchocerca spp.

Εντερικά παράσιτα (ενήλικα)

Strongyloides westeri

Γαστρόφιλοι

Gasterophilus spp.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιηθεί σε φοράδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μερικά άλογα με υψηλή προσβολή από μικροφιλάριες *Onchocerca* έχουν εμφανίσει οίδημα και κνίδωση μετά τη χορήγηση, που θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα του θανάτου μεγάλου αριθμού μικροφιλαριών. Αυτά τα συμπτώματα παρέρχονται σε λίγες ημέρες αλλά πιθανόν να απαιτείται συμπτωματική αγωγή. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια ή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως, παρακαλούμε ενημερώστε τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Άλογα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το σωματικό βάρος και η δόση να προσδιορίζονται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία. Κάθε σύρριγγα χορηγεί 120 mg ιβερμεκτίνης, που επαρκεί για τη θεραπεία 600 kg σωματικού βάρους (συνιστώμενη δόση 0,2 mg ιβερμεκτίνης / kg σ.β.). Κάθε διαβάθμιση βάρους στο έμβολο της σύριγγας παρέχει επαρκή ποσότητα πάστας για τη θεραπεία 100 kg σωματικού βάρους. Ξεκλειδώστε το δακτύλιο κάνοντας στροφή $\frac{1}{4}$ και κυλίστε το δακτύλιο έως την αιχμή του εμβόλου έτσι ώστε η πιο κοντινή στο σώμα της σύρριγγας πλευρά να είναι στην επιθυμητή διαβάθμιση σωματικού βάρους. Περιστρέψτε το δακτύλιο κάνοντας στροφή $\frac{1}{4}$ ώστε να κλειδωθεί στη θέση του. Βεβαιωθείτε ότι το στόμα του αλόγου δεν περιέχει τροφή. Απομακρύνετε το πλαστικό πώμα από το άκρο του ρύγχους. Εισάγετε τη σύριγγα στο στόμα του αλόγου από το μεσοδόντιο διάστημα. Σπρώξτε το έμβολο όσο επιτρέπεται να προωθηθεί, αφήνοντας το φάρμακο στη βάση της γλώσσας. Σηκώστε αμέσως το κεφάλι του αλόγου για μερικά δευτερόλεπτα μετά τη χορήγηση. Προϊόν μιας δόσης. Να απορρίπτεται η συσκευασία μετά τη χρήση. Για καλύτερα αποτελέσματα: Το θεραπευτικό σχήμα πρέπει να βασίζεται στην τοπική επιδημιολογική κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές παρακαλούμε συμβουλευθείτε κτηνίατρο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Για τη χορήγηση της σωστής δόσης, το σωματικό βάρος να προσδιορίζεται με ακρίβεια πριν τη θεραπεία. Εάν τα ζώα θα υποβληθούν σε θεραπεία ομαδικά και όχι ατομικά, να ομαδοποιούνται σύμφωνα με το σωματικό τους βάρος και η δόση να είναι η ανάλογη, ώστε να αποφεύγεται υπερ- ή υπο- δοσολογία.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 34 ημέρες.
Να μη χρησιμοποιηθεί σε φοράδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Αποκλειστικά για κτηνιατρική χρήση.
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν παιδιά.

Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά το άνοιγμα της δοσομετρικής σύριγγας.
Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Θα πρέπει να λαμβάνεται φροντίδα, ώστε να αποφεύγονται οι ακόλουθες πρακτικές, οι οποίες αυξάνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και τελικώς έχουν ως αποτέλεσμα μια αναποτελεσματική θεραπεία:

- Συχνή και επαναλαμβανόμενη χρήση ανθελμινθικών της ίδιας ομάδας για παρατεταμένη χρονική περίοδο.
- Υπο- δοσολογία, η οποία μπορεί να οφείλεται σε λανθασμένη εκτίμηση του σωματικού βάρους ή κακή χορήγηση του προϊόντος.

Κλινικά περιστατικά ύποπτα για υπάρχουσα ανθεκτικότητα στα ανθελμινθικά θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω με κατάλληλες δοκιμές (π.χ. Δοκιμή Μείωσης του Αριθμού των Αυγών στα Κόπρανα). Στις περιπτώσεις που οι δοκιμές δείχνουν ισχυρή ανθεκτικότητα σε συγκεκριμένο ανθελμινθικό, να χρησιμοποιείται ανθελμινθικό διαφορετικής ομάδας και τρόπου δράσης.

Σε αρκετές χώρες, περιλαμβανομένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει αναφερθεί ανθεκτικότητα του *Parascaris equorum* των αλόγων στην ιβερμεκτίνη. Για το λόγο αυτό, η χρήση του Maximec θα πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες γύρω από την τοπική επιδημιολογική κατάσταση για την ευαισθησία των νηματωδών και σε συστάσεις για τον περιορισμό επιπλέον ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα ανθελμινθικά.

Η δράση των αγωνιστών του νευροδιαβίβαστή γ - αμινοβουτυρικό οξύ αυξάνεται από την ιβερμεκτίνη.

Ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται από το άτομο που χορηγεί το φαρμακευτικό προϊόν σε ζώα.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το προϊόν. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής με το δέρμα πλύνετε αμέσως την προσβεβλημένη περιοχή με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση κατά λάθος επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε τα με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια, εάν είναι απαραίτητο.

Πλύνετε τα χέρια μετά τη χρήση.

Ειδικές προφυλάξεις για ζώα που δεν είναι στόχος.

Το προϊόν έχει μορφοποιηθεί για χρήση μόνο σε άλογα. Γάτες, σκύλοι, ιδίως Collies, Old English Sheepdogs και σχετικές φυλές ή διασταυρώσεις, επίσης χελώνες νερού και ξηράς μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες από τη συγκέντρωση της ιβερμεκτίνης σ' αυτό το προϊόν εάν καταπόσουν πάστα ή έρθουν σε επαφή με χρησιμοποιημένες σύριγγες.

Χρήση κατά την κύηση και γαλουχία.

Μελέτες σε ζώα εργαστηρίου δεν έδειξαν τερατογένεση ή εμβρυοτοξικότητα της ιβερμεκτίνης στη συνιστώμενη θεραπευτική δόση. Η ασφάλεια του κτηνιατρικού

φαρμακευτικού προϊόντος δεν έχει καταδειχθεί κατά την κύηση και γαλουχία. Να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από εκτίμηση από τον υπεύθυνο κτηνίατρο του παράγοντα κίνδυνος/όφελος.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΆΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ.**

Να μη μολύνονται επιφανειακά ύδατα ή ρεύματα με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Οποιοδήποτε αχρησιμοποιήτο προϊόν ή περιέκτες μετά τη χρήση πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.