

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

OPTIPRIME® injectable suspension 48%
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OPTIPRIME® injectable suspension 48%

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Το 1 ml εναιωρήματος περιέχει:

Δραστικά συστατικά: 400 mg Sulfadiazine, 80 mg Trimethoprim

Έκδοχα: Sodium hydroxide, Diethanolamine, Sodium metabisulphite, Polysorbate 80, Sodium hydroxide sol., Purified water

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το OPTIPRIME® inj. 48% μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία μεγάλου αριθμού βακτηριακών λοιμώξεων στους μόσχους, στα πρόβατα και στους χοίρους. Ειδικότερα συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:

-Θεραπεία των βακτηριακών λοιμώξεων του αναπνευστικού, όπως πνευμονία, βρογχίτιδα και ρινίτιδα, καθώς και των δευτερογενών επιπλοκών που ακολουθούν τις ιογενείς και τις μυκοπλασματικές λοιμώξεις του αναπνευστικού.

-Θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού, γεννητικού, όπως νεφρίτιδα, κυστίτιδα, επιλόχειες λοιμώξεις και ιδιαίτερα το σύνδρομο Μαστίτιδας-Μητρίτιδας-Αγαλαξίας (Μ.Μ.Α.) του χοίρου.

-Θεραπεία λοιμώξεων του πεπτικού συστήματος και ιδιαίτερα αυτών που προκαλούνται από ευαίσθητα στο συνδυασμό στελέχη *Escherichia coli* και *Salmonella* spp.

-Θεραπεία σηψαιμικών καταστάσεων, επιμολυσμένων τραυμάτων και μετεγχειρητικών λοιμώξεων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται ενδοφλέβια ή ενδοπεριτοναϊκά.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζεται στο σημείο της ένεσης τοπικό οίδημα που υποχωρεί γρήγορα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Μόσχοι, Πρόβατα, Χοίροι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται μόνο ενδομυϊκά.

Μόσχοι-Πρόβατα-Χοίροι: 15-20 mg του συνδυασμού σουλφαδιαζίνης-τριμεθοπρίμης ανά kg σ.β., δηλαδή 1 ml OPTIPRIME® inj. 48%/ 30 kg σ.β. έως 1 ml OPTIPRIME® inj. 48%/ 25 kg σ.β. ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συνήθως μια δόση είναι αρκετή. Σε σοβαρές, όμως, περιπτώσεις η θεραπεία μπορεί να επεκταθεί μέχρι 5 ημέρες. Σε σοβαρές περιπτώσεις να συνεχιστεί καθημερινά 2 ημέρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων και όχι περισσότερο από 5 ημέρες.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: Μόσχοι: 16 ημέρες

Κρέας: Πρόβατα-Χοίροι: 25 ημέρες

Να μη χορηγείται σε πρόβατα, το γάλα των οποίων προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 28 ημέρες

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδια των 50 ml και 100 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 23407/30-03-2009/Κ-0006204

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777