

Surolan®

(μικοναζόλη, πολυμυξίνη, πρεδνιζολόνη)
για σκύλους και γάτες

ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ ΩΤΙΚΟ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΟ

ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

Δραστικά συστατικά: Κάθε 1 ml περιέχει:

Νιτρική μικοναζόλη 23 mg

Οξεική πρεδνιζολόνη 5 mg

Θειική πολυμυξίνη Β 0.5293 mg

Άλλα συστατικά: Κολλοειδές οξειδιο του πυριτίου 7.5 mg
Υγρή παραφίνη qs ad 1 ml

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Surolan χρησιμοποιείται στο σκύλο και τη γάτα για τη θεραπεία της ωτίτιδας και των δερματικών λοιμώξεων που προκαλούνται από μύκητες, ζυμομύκητες, Gram-αρνητικά και Gram-θετικά βακτήρια.

Ζύμες και μύκητες:

Microsporum spp.

Trichophyton spp.

Candida spp.

Malassezia pachydermatis

Gram-θετικά βακτήρια:

Staphylococcus spp. (ευαίσθητα στελέχη)

Streptococcus spp. (ευαίσθητα στελέχη)

Gram-αρνητικά βακτήρια:

Pseudomonas spp. (ευαίσθητα στελέχη)

Escherichia coli

Ακάρεα ωτός

Otodectes cynotis

Το Surolan έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί κατά του κνησμού.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε περιπτώσεις που τα ζώα παρουσιάζουν ρήξη της τυμπανικής μεμβράνης (ρήξη τυμπάνου), επειδή είναι γνωστό ότι η πολυμυξίνη Β είναι ισχυρός ωτοτοξικός παράγοντας.

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τα στεροειδή να μη χορηγούνται στα έγκυα ζώα.

Μακροχρόνια τοπική δερματολογική χρήση ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν στεροειδή μπορεί να προκαλέσει πάχυνση του δέρματος της περιοχής καθώς και καθυστέρηση στην επούλωση δερματικών ελκών.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικούς τον κτηνίατρό σας.

ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Σκύλος, Γάτα.