

ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Vanguard 7

- 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Παρασκευαστής: PFIZER ANIMAL HEALTH SA BELGIUM

Συσκευαστής : PFIZER ANIMAL HEALTH SA BELGIUM

Σημείο απελευθέρωσης της παρτίδας: Pfizer Manufacturing Belgium NV, Puurs, Belgium

Υπεύθυνος άδειας κυκλοφορίας: Pfizer HELLAS AE, Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210 6785800

ΑΜΚ : 32423/3-10-2000

- 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Vanguard 7

- 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

Κάθε μία δόση 1 ml περιέχει:

Λυοφιλοποιημένο τμήμα

Ζωντανός εξασθενημένος ιός της νόσου του Carre στέλεχος N-CDV,

το ελάχιστο 10^3 CCID₅₀

Ζωντανό εξασθενημένο αδενοϊό τύπος 2, στέλεχος Manhattan,

το ελάχιστο $10^{3,2}$ CCID₅₀

Ζωντανό εξασθενημένο ιό παραινφλουένζας, στέλεχος NL-CPI-5,

το ελάχιστο $10^{6,0}$ CCID₅₀

Υγρό τμήμα

Ζωντανό εξασθενημένο παρβοϊό σκύλου, στέλεχος NL-35-D,

το ελάχιστο 10^7 CCID₅₀

Αδρανοποιημένη *Leptospira canicola*, το ελάχιστο 60 NU

Αδρανοποιημένη *Leptospira icterohaemorrhagiae*, το ελάχιστο 60NU

Έκδοχα

Albumine max 1.5MG

Water for injection q.s 1 ml

- 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Το Vanguard 7 είναι ένα πολυδύναμο εμβόλιο για την ανοσοποίηση υγιών σκύλων κατά της νόσου του Carre (Canine distemper) της λοιμώδους ηπατίτιδας, του παρβοϊού, της λεπτοσπείρωσης (L.canicola και L.icterohaemorrhagiae) και της αναπνευστικής νόσου (Adenovirus type 2 και Parainfluenza)

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην εμβολιάζονται ασθενή ή έγκυα ζώα.

Να μην χορηγείται υπεράνοσος ορός ή ανοσοκατασταλτικά φάρμακα, έως και ένα μήνα από την ημέρα του εμβολιασμού.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης παροδικού οιδήματος στο σημείο της ένεσης.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης,, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι από την ηλικία των 6 εβδομάδων

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Προσθέσατε το υγρό τμήμα του εμβολίου στο λυοφιλοποιημένο τμήμα, ανακινείστε καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόμενο αμέσως υποδόρια.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Προσθέσατε το υγρό τμήμα του εμβολίου στο λυοφιλοποιημένο τμήμα, ανακινείστε καλά και χορηγείστε όλο το περιεχόμενο αμέσως υποδόρια.

Έχει αποδειχθεί ότι το Vanguard-7 είναι ασφαλές για τον εμβολιασμό νεαρών σκύλων από την ηλικία των 6 εβδομάδων.

Όταν οι σκύλοι που εμβολιάζονται έχουν ηλικία μικρότερη των 12 εβδομάδων, πρέπει να επανεμβολιάζονται κάθε 3-4 εβδομάδες έως την ηλικία των 16-18 εβδομάδων. Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πιθανότητα εξουδετέρωσης των εμβολιακών ιών από υπάρχοντα μητρικά αντισώματα.

Μια μόνο δόση του ανασυσταθέντος προϊόντος είναι αρκετή για την πλήρη ανοσοποίηση των ενήλικων σκύλων. Όταν όμως εμβολιάζονται ζώα για πρώτη φορά κατά της λεπτοσπείρωσης, απαιτείται και μία δεύτερη δόση εμβολίου κατά της λεπτοσπείρωσης μετά από 14 ημέρες

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν εφαρμόζεται.

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Φυλάσσετε σε θερμοκρασία +2 °C - +8 °C προστατευμένο από το φως.

Να μη καταψύχεται.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο χρόνος ζωής είναι 24 μήνες.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.