

CEVALACTYL®

Σκόνη για πόσιμο διάλυμα

Περιέχει ουσίες που υποβοηθούν τη λειτουργία της μεγάλης κοιλίας.

ΣΥΝΘΕΣΗ

- Sodium propionate.....50 g
- Wheat bran.....26 g
- Oleic polyoxyethylene glycerides.....2 g
- Divided brewer's yeast.....2 g
- Calcium phosphate dibasic.....10 g
- Gentian powder (roots).....10 g

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το Cevalactyl δρώντας ως ευστόμαχο χρησιμοποιείται μόνο του, ή σε συνδυασμό με άλλα ιδιοσκευάσματα για τη θεραπεία των παρακάτω παθολογικών καταστάσεων:

Δυσπεψία των μηρυκαστικών.

Στομαχικός φόρτος.

Αναστολή του μηρυκασμού εξ αιτίας διαφόρων stress.

Δυσπεψία των μόσχων κατά τον απογαλακτισμό.

Ανορεξία των μόσχων.

Δυσκοιλιότητα των μόσχων.

Ατονία της μεγάλης κοιλίας.

Αφρώδης μετεωρισμός.

Διαταραχές της λειτουργίας της μικροβιακής χλωρίδας.

ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ

Το Cevalactyl χορηγείται, αφού προηγουμένως διαλυθεί σε λίγο νερό, με τη βοήθεια πλαστικής σύριγγας ή οισοφαγικού καθετήρα στις ακόλουθες δόσεις:

-Νεαρά Βοοειδή-Αιγοπρόβατα: ½ φακελλίσκος το πρωί και ½ το βράδυ.

-Ενήλικα Βοοειδή: 1 φακελλίσκος το πρωί και 1 το βράδυ.

-Απογαλακτισμένοι Μόσχοι: 1 κουταλιά της σούπας το πρωί και 1 το βράδυ.

-Απογαλακτισμένα Αμνοερίφια: 1 κουταλιά του καφέ το πρωί και 1 το βράδυ.

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ

Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος το προϊόν παραμένει σταθερό για 2,5 χρόνια.

ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Δεν υπάρχει.