

**CEVAC NEW L**  
**NEWCASTLE DISEASE VACCINE**  
**ΕΜΒΟΛΙΟ ΨΕΥΔΟΠΑΝΩΛΗΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ**  
**ΣΤΕΛΕΧΟΣ LASOTA**

Το CEVAC New L είναι εμβόλιο από ζωντανό ιό, αποξηραμένο και σφραγισμένο σε κενό.  
Διατηρείται στο ψυγείο σε θερμοκρασία 2-5° C.

#### **ΣΥΝΘΕΣΗ (ανά δόση εμβολίου)**

Newcastle disease virus, Strain Lasota                  min       $10^{5.5}$  EID<sub>50</sub>

#### **ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ**

- με πόσιμο νερό

1. Μη χρησιμοποιείτε απολυμαντικά διαλύματα στο πόσιμο νερό 48 ώρες πριν και 24 ώρες μετά τον εμβολιασμό.
2. Μη χορηγείτε νερό στα πτηνά 4 ώρες πριν τον εμβολιασμό. Καθαρίστε καλά τις πποτίστρες με νερό χωρίς να χρησιμοποιήσετε απολυμαντικά.
3. Αναμίξτε το περιεχόμενο του φιαλιδίου των 1000 δόσεων με καθαρό δροσερό πόσιμο νερό ως εξής:

- α) Για 1000 πτηνά ηλικίας 3 ημερών – 4 εβδομάδων σε 10 kg νερό.
  - β) Για 1000 πτηνά ηλικίας 4 εβδομάδων – 8 εβδομάδων σε 20 kg νερό.
  - γ) Για 1000 πτηνά ηλικίας 8 εβδομάδων και άνω σε 40 kg νερό.
4. Για τη σταθεροποίηση του εμβολίου δυνατό να προστεθούν 90 gr άπαχο γάλα σκόνη σε 40 kg νερό που χρησιμοποιείται για τον εμβολιασμό.
  5. Αφού αναμείξετε το εμβόλιο με το νερό τοποθετήστε το στις πποτίστρες των πτηνών. Συνιστάται να αυξήσετε τον αριθμό των πποτιστρών και τα πτηνά να μετακινούνται, ώστε να μπορούν όλα να πιουν.
  6. Μη χορηγείτε στα πτηνά άλλο νερό πριν καταναλωθεί αυτό που περιέχει το εμβόλιο. Αμέσως μετά μπορείτε να συνεχίσετε τη χορήγηση του νερού όπως συνήθως.

- με ενστάλαξη στον οφθαλμό

Για τη χορήγηση του εμβολίου με ενστάλαξη στον οφθαλμό χρησιμοποιείται ως διαλύτης φυσιολογικός ορός 30 ml για 1000 δόσεις εμβολίου. Μια δόση εμβολίου μετά την ανασύστασή του είναι μια σταγόνα.

#### **ΗΛΙΚΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ**

Η μέθοδος χορήγησης με το πόσιμο νερό μπορεί να εφαρμοστεί σε πτηνά οποιασδήποτε ηλικίας, ξεκινώντας από την 3<sup>η</sup> ημέρα της ζωής τους, είτε για αρχικό εμβολιασμό ή για επανεμβολιασμό.

Η μέθοδος ενστάλαξης στον οφθαλμό μπορεί να εφαρμοστεί σε πτηνά οποιασδήποτε ηλικίας, από 1ας ημέρας έως και σε ενήλικα που βρίσκονται στην παραγωγή, είτε ως αρχικός εμβολιασμός ή ως επανεμβολιασμός.

Για καλύτερα αποτελέσματα πτηνά που εμβολιάζονται σε ηλικία 1-3 ημερών να επανεμβολιάζονται 3-4 εβδομάδες αργότερα. Πτηνά που προορίζονται για αντικατάσταση να επανεμβολιάζονται σε ηλικία 16-20 εβδομάδων και στη συνέχεια κάθε 6 μήνες.

## **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ**

1. Χορηγείστε το πόσιμο νερό με το εμβόλιο αμέσως μετά την ανάμιξη όλο εφάπαξ χωρίς να υπερβαίνετε τις καθορισμένες δόσεις.
2. Μετά τον εμβολιασμό κάψτε τα άδεια φιαλίδια με τα τυχόν υπολείμματα του εμβολίου.
3. Εμβολιάζονται μόνο υγιή πτηνά. Όμως σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμβόλιο ως μέσο ελέγχου της εκδήλωσης της ψευδοπανώλης, όταν χρησιμοποιηθεί αμέσως μόλις εκδηλωθεί η επιδημία.
4. Ο ίος της ψευδοπανώλης μπορεί να προκαλέσει ήπια φλεγμονή στους οφθαλμούς του ανθρώπου, που παρέρχεται σε 2-3 ημέρες. Θα πρέπει να δίνεται η ανάλογη προσοχή ώστε να αποφεύγεται η επαφή του ιού με τους οφθαλμούς του ατόμου που χειρίζεται το εμβόλιο.

## **ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Να μην εμβολιάζονται τα πτηνά 21 ημέρες πριν τη σφαγή.