

Αδρανοποιημένα εμβόλια για την ενεργητική αναστοποίηση των προβάτων κατά της λοιμώδους αγαλαξίας που οφείλεται στο *Mycoplasma agalactiae*

## Agalax

### ΣΥΝΘΕΣΗ

1 δόση εμβολίου 2 ml περιέχει: Δραστικό συστατικό:	1x10 <sup>8</sup> CFU* / ml
<i>Mycoplasma agalactiae</i>	2 ml
Έκδοχα . . . . .	έως . . . . .

\*Colony Forming Units.

### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Για την ενεργητική αναστοποίηση των προβάτων κατά της λοιμώδους αγαλαξίας που οφείλεται στο *Mycoplasma agalactiae*.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ζώα που δεν είναι υγιή, ζώα καταπονημένα ή ύποπτα μόλυνσης δεν πρέπει να εμβολιάζονται.

### ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δυνατό να παρατηρηθεί ελαφρά μείωση της γαλακτοπαραγωγής, διάρκειας μερικών ημερών, όταν εμβολιάζονται τα θηλυκά ζώα στην περίοδο της γαλακτοπαραγωγής.  
Ελαφρά φλεγμονή στο σημείο εμβολιασμού θεωρείται φυσιολογική και εξαφανίζεται σε μερικές ημέρες.

### ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Πρόβατα.

### ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγούνται υποδόρια 2 ml σε κάθε ζώο. Προτιμάται η περιοχή της μασχάλης, πίσω από τον αγκώνα όπου δεν υπάρχει μαλλί. Συνιστάται επανεμβολιασμός των ζώων που εμβολιάζονται για πρώτη φορά μετά ένα μήνα και στη συνέχεια ο επήσιος εμβολιασμός. Σε περιοχές που ενδημεί η νόσος συνιστάται ο εμβολιασμός κάθε 6 μήνες.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καλή ανατάραξη του περιεχομένου του φιαλίδιου πριν τη χρήση. Να απολυμαίνονται το σημείο εμβολιασμού και το πώμα του φιαλίδιου και να χρησιμοποιούνται αποστειρωμένες σύριγγες και βελόνες (διαφορετική βελόνα για τον εμβολιασμό από αυτήν για την εξαγωγή του εμβολίου από το φιαλίδιο). Μετά το πρώτο άνοιγμα του φιαλίδιου, το εμβόλιο να χρησιμοποιείται αμέσως.