



1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ!

Δικαιούχος σήματος: Pfizer Inc, NY, USA
ΚΑΚ σε Ελλάδα και Κύπρο: ZOETIS HELLAS SA,
Λ. Μεσογείων 253-255, Ν. Ψυχικό, Αθήνα, τηλ: 210
6785800, ΑΜΚ: 40577

Τοπικός διανομέας στην Κύπρο: VitaTrace Nutrition
Ltd, 2033, Στρόβολος, ΑΑΚ: CY00143V
τηλ: 22 426527

Παρασκευαστής: Pharmaserve UK

2. ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ

Rimadyl Tablets 100 mg

Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg καρπροφένη.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ (Α) ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Δραστικό (ά) συστατικό (ά) :

Κάθε δισκίο περιέχει 100 mg καρπροφένη.

Έκδοχα:

Lactose Monohydrate	161,0 mg
Starch Maize Pregelated	15,0 mg
Sodium Starch Glycolate type A	15,0 mg
Silica Anhydrous, Colloidal	1,6 mg
Magnesium Stearate	2,4 mg
Talc	5,0 mg
Water Purified	Q.S

4. ΕΝΔΕΙΞΗ (ΕΙΣ)

Στο σκύλο ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου τόσο σε οξείες όσο και σε χρόνιες μυοσκελετικές ανωμαλίες, όπως για παράδειγμα η οστεοαρθρίτιδα. Χρησιμοποιείται επίσης ως αναλγητικός και αντιφλεγμονώδης παράγοντας στην αντιμετώπιση του πόνου μετεγχειρητικά στον σκύλο.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μην υπερβαίνεται η συνιστώμενη δοσολογία και διάρκεια θεραπείας.

Να μη χορηγείται σε ζώα με καρδιακή, ηπατική, νεφρική ανεπάρκεια, αν υπάρχει πιθανότητα γαστροεντερικής αιμορραγίας ή σε περιπτώσεις δυσκρασίας του αίματος.

Όπως και σε άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, η χρήση του σπάνια είναι δυνατόν να προκαλέσει νεφρική ή ιδιοσυγκρασιακού τύπου ηπατική νόσο. Να μην χορηγούνται άλλα φάρμακα της ίδιας κατηγορίας ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Μερικά NSAIDs μπορεί να ενώνονται ισχυρά με πρωτεΐνες του πλάσματος του αίματος και να ανταγωνίζονται άλλες ουσίες που σχηματίζουν τέτοιους ισχυρούς δεσμούς γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικά φαινόμενα.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Τυπικά ανεπιθύμητα συμπτώματα συνδεόμενα με τη χορήγηση NSAIDs, όπως έμετος, υδαρή κόπρανα ή διάρροια, αιματηρά κόπρανα, απώλεια της όρεξης και λήθαργος έχουν αναφερθεί. Αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται γενικά μέσα στη πρώτη εβδομάδα, είναι ήπια στις περισσότερες περιπτώσεις και εξαφανίζονται την πρώτη εβδομάδα της θεραπείας αλλά σε κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να γίνουν σοβαρά ή μοιραία.

Εάν παρατηρηθούν ανεπιθύμητες ενέργειες, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται και η συμβουλή του κτηνιάτρου θα πρέπει να ζητείται.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλοι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η δόση εφόδου είναι 2-4 mg /κιλό σωμα.βάρους /ημέρα χορηγούμενη σε δύο ίσες δόσεις. Μετά από 7 ημέρες και ανάλογα με την κλινική ανταπόκριση