

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

OPTIPRIME® piglet oral suspension
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OPTIPRIME® piglet oral suspension

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 ml εναιωρήματος περιέχουν:

Δραστικά συστατικά: 4,55 g Sulfadiazine, 0,91 g Trimethoprim

Έκδοχα: Bevaloid 35, Glycerol, Xanthan gum, Chlorocresol, Purified water

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το OPTIPRIME piglet suspension ενδείκνυται για τη θεραπεία της βακτηριακής διάρροιας των νεογέννητων χοιριδίων, αλλά και για λοιμώξεις που οφείλονται σε βακτήρια θετικά και αρνητικά κατά Gram, ευαίσθητα στο συνδυασμό σουλφαδιαζίνης με τριμεθοπρίμη.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις σουλφοναμίδες, με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νεφρικές βλάβες (από κρυστάλλωση της σουλφοναμίδης), καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές διαταραχές.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι (χοιρίδια)

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Γίνεται χορήγηση από το στόμα 15 mg συνδυασμένων δραστικών συστατικών/ kg/ 12 ώρες που αντιστοιχεί σε 1,1 ml/ 2 kg σ.β. (μία παροχή της δοσομετρικής συσκευής) την ημέρα. Η θεραπεία διαρκεί έως και 2 ημέρες μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων και δεν υπερβαίνει συνολικά τις 5 ημέρες.

Η χορήγηση γίνεται τοποθετώντας την άκρη του σωληναρίου της δοσομετρικής συσκευής στη βάση της γλώσσας του χοιριδίου. Για τη χορήγηση της σωστής ποσότητας η φιάλη κρατείται σε όρθια θέση. Η δοσομετρική συσκευή μπορεί να παραμείνει προσαρμοσμένη στη φιάλη κατά τη διάρκεια διαδοχικών χορηγήσεων του φαρμάκου. Εφόσον αποσυνδεθεί από τη φιάλη, η τελευταία πωματίζεται και η συσκευή ξεπλένεται με διαδοχικές αντλήσεις καθαρού νερού και φυλάσσεται σε καθαρό χώρο.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Χοίροι: Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 4 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 1 μήνας

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Οι σουλφοναμίδες δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με προκαϊνούχο πενικιλίνη και με ιόντα ασβεστίου. Σε ταυτόχρονη χορήγηση με αντιόξινα μειώνεται η βιοδιαθεσιμότητά τους. Οι σουλφοναμίδες ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση της φουροσεμίδης, των θειαζιδών, των αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης και της σουλφονυλουρίας.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη των 200 ml

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 26793/08-04-2013/Κ-0006205

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777**