

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

OPTIPRIME® oral suspension
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλιμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
OPTIPRIME® oral suspension

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 ml εναιωρήματος περιέχουν:

Δραστικά συστατικά: 40 g Sulfadiazine, 8 g Trimethoprim

Έκδοχα: Sodium hydroxide, Diethanolamine, Sodium metabisulphite, Polysorbate 80 (Tween 80), Sodium hydroxide sol. 30% q.s. pH 10,00-10,5, Purified water

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το OPTIPRIME oral suspension ενδείκνυται για τη θεραπεία λοιμώξεων που οφείλονται σε βακτήρια θετικά και αρνητικά κατά Gram, καθώς και για δευτερογενείς βακτηριακές επιπλοκές της Χρόνιας Αναπνευστικής Νόσου (Χ.Α.Ν.) των κρεοπααραγωγών ορνιθίων (broilers).

Είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από *Escherichia coli*, *Salmonella* spp. και *Pasteurella* spp., όπως η κολοβακτηριδιακή σηψαιμία και ο τύφος των ορνιθίων.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ζώα με ιστορικό υπερευαισθησίας στις σουλφοναμίδες, με ηπατική ή νεφρική ανεπάρκεια.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μπορεί να προκληθούν αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νεφρικές βλάβες (από κρυστάλλωση της σουλφοναμίδης), καταστροφή της φυσιολογικής μικροχλωρίδας και γαστρεντερικές διαταραχές.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ορνίθια κρεοπαραγωγής (broilers)

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορήγηση από το στόμα 15-30 mg συνδυασμένων δραστικών συστατικών/ kg/ 24 ώρες στα κρεοπαραγωγά ορνίθια (broilers).

Το εναιώρημα αραιώνεται σε αναλογία 1-2 ml ανά 5 l πόσιμου νερού. Η αναλογία αυτή είναι ενδεικτική για κρεοπαραγωγά ορνίθια ηλικίας 6 εβδομάδων περίπου. Η διάρκεια της θεραπείας δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

Η απαιτούμενη ποσότητα του εναιωρήματος αραιώνεται αρχικά σε μικρό όγκο νερού, το οποίο στη συνέχεια προστίθεται στη δεξαμενή πόσιμου νερού ή στο πόσιμο νερό που πρόκειται να καταναμηθεί στις ποτίστρες.

Καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας χορηγείται αποκλειστικά και μόνο πόσιμο νερό που περιέχει το φάρμακο.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να πλένονται τα χέρια μετά τη χρήση.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Ορνίθια: Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 3 ημέρες

Να μη χορηγείται σε ωοπαραγωγές όρνιθες, τα αυγά των οποίων προορίζονται για εκκόλαψη ή για ανθρώπινη κατανάλωση.

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας: 1 μήνας

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Οι σουλφοναμίδες δεν πρέπει να χορηγούνται ταυτόχρονα με προκαϊνούχο πενικιλίνη και με ιόντα ασβεστίου. Σε ταυτόχρονη χορήγηση με αντιόξινα μειώνεται η βιοδιαθεσιμότητά τους. Οι σουλφοναμίδες ενδέχεται να ενισχύσουν τη δράση της φουροσεμίδης, των θειαζιδών, των αναστολέων της καρβονικής ανυδράσης και της σουλφονυλουρίας.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη των 200 ml και 1000 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 26792/08-04-2013/Κ-0006203

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777