

## ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

### DRONCIT® tablets ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

#### 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

**Bayer Animal Health GmbH**

D-51368 Leverkusen

Germany

#### 2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DRONCIT® tablets

#### 3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Κάθε δισκίο περιέχει:

**Δραστικό συστατικό:** 50 mg Praziquantel

**Έκδοχα:** Lactose monohydrate, Microcrystalline cellulose, Polyvinylpyrrolidone 25, Sodium lauryl sulfate, Magnesium stearate, Silicon dioxide colloidal, Maize starch

#### 4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Για την καταπολέμηση των σπυδαιότερων ειδών κεστωδών που είναι υπεύθυνα για τις παρασιτικές ζωανθρωπινόσους και τα οποία προκαλούν συγχρόνως την ταινίαση των σαρκοφάγων όπως: *Echinococcus granulosus*, *Echinococcus multilocularis*, *Dipylidium caninum*, *Mesocestoides corti*, *Diphyllobothrium (Spirometra) erinacei* και *Taenia multiceps*.

Επίσης, για την καταπολέμηση των υπόλοιπων ταινιάσεων των σαρκοφάγων που οφείλονται στα είδη: *Taenia ovis*, *Taenia hydatigena*, *Taenia pisiformis*, *Taenia taeniaformis* και *Joyeuxiella pasqualei*.

#### 5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

#### 6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν υπάρχουν, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. Τα περιθώρια ασφαλείας του Droncit® είναι τόσο μεγάλα, που είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η LD<sub>50</sub> στους σκύλους και τις γάτες. Μπορεί να χορηγηθεί σε έγκυα ζώα χωρίς καμία επίπτωση στο έμβρυο. Το Droncit® γίνεται καλά ανεκτό και δε χρειάζεται να προηγηθεί της χορήγησής του δίαιτα.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

#### 7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Σκύλος, Γάτα

#### 8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η γενική συνιστώμενη δόση ανέρχεται σε 5 mg ανά kg σωματικού βάρους, που αντιστοιχεί με ένα δισκίο ανά 10 kg σ.β. Τα δισκία Droncit® χορηγούνται αυτούσια ή μέσα σε τεμάχια κρέατος ή ακόμη και αλεσμένα με την τροφή ως εξής.

Σκύλος

Μέχρι 2,5 kg: 1/4 του δισκίου

2,6-5 kg: 1/2 δισκίο

6-10 kg: 1 δισκίο

11-20 kg: 2 δισκία

21-30 kg: 3 δισκία

Γάτα

Μικρά γατάκια: 1/4 του δισκίου

Ενήλικες γάτες: 1/2 δισκίο

#### **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Δεν απαιτούνται.

#### **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Δεν απαιτείται.

#### **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται σε χώρο δροσερό και ξηρό προστατευμένο από το φως.

#### **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΛΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμία

#### **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

#### **14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

##### **ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**

Χάρτινο κουτί με 50 δισκία (5x10) σε blister

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 8768/14-03-1990/Κ-0023301

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

*\*χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου\**

**ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**

**ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777**