

EURAVIT[®] w.s.p.

Υδατοδιαλυτή σκόνη

ΠΡΟΜΙΓΜΑ για χορήγηση με το πόσιμο νερό σε Πτηνά, Χοιρίδια, Μόσχους, Πώλους

Πρόσθετες ύλες (ανά 100 g)	
Βιταμίνες	
Βιταμίνη D ₃ (E671)	500.000 IU
Βιταμίνη E (ρακεμ. μείγμα όλων των στερε/ρων της οξ. α-τοκοφ. – 3a700)	520 mg
Νατριούχος Διθειώδης Μenaδιόνη (3a710)	187 mg
Βιταμίνη B ₂ (riboflavin sodium phosphate)	154 mg
Βιταμίνη B ₁ (υδροχλωρική θειαμίνη - 3a820)	135 mg
Βιταμίνη B ₆ (υδροχλωρική πυριδοξίνη-3a831)	180 mg
Βιταμίνη B ₁₂	2 mg
Νικοτιναμίδιο (3a315)	2.000 mg
D-παντοθενικό ασβέστιο (3a841)	650 mg
Φολικό οξύ (3a316)	40 mg
Αντιοξειδωτικά	
Ασκορβικό νάτριο (1b301)	1.778 mg
Γαλακτωματοποιητές, σταθεροποιητές, πυκνωτικά μέσα και παράγοντες πηγμάτωσης	
Πολυαιθυλενογλυκόλη 6000 (E496)	1.500 mg
Συνδετικά, αντιπηκτικά και θρομβωτικά μέσα	
Διοξείδιο του πυριτίου (E551b)	500 mg

Φορέας: άνυδρη δεξτρόζη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χορηγείται με το πόσιμο νερό.

Μόσχου, πώλοι: 2 g ανά ζώο την ημέρα, επί 3-5 ημέρες.

Χοιρίδια: 1 g ανά ζώο την ημέρα, επί 3-5 ημέρες. Επειδή το EURAVIT[®] w.s.p. είναι ευδιάλυτο στο κρύο νερό, το παρασκευαζόμενο διάλυμα μπορεί να χορηγηθεί και με αυτόματη δοσομετρική συσκευή.

Πτηνά: 100 g την ημέρα για 2.500 νεοσσούς ή 2.000 πουλάδες ή 1.250 αυγοπαραγωγές όρνιθες επί 3-5 ημέρες. Διαλύονται αρχικά 100 g EURAVIT[®] w.s.p. σε 10 L νερού και το διάλυμα αυτό προστίθεται στο πόσιμο νερό της ημερήσιας κατανάλωσης.

Η δοσολογία μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη γνώμη ειδικού.

ΦΥΛΑΞΗ: Να φυλάσσεται σε ξηρό μέρος, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο και σε θερμοκρασία όχι μεγαλύτερη των 25°C.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Συσκευασία: Φάκελος των 100g, Δοχείο 1kg

Παρασκευαστής: PROVET AE

Έδρα – Εργοστάσιο – Εξυπηρέτηση Πελατών:

Νικηφόρου Φωκά & Αγ. Αναργύρων, 19300 Ασπρόπυργος, Αττική

Τηλ.: 210 5575770, 210 5508500, Fax: 210 5575830, www.provet.gr, vet@provet.gr

Αρ. Έγκρισης αΕΛ 0200003

