

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TIAMUVET® premix 2%
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλμος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TIAMUVET® premix 2%

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 g προϊόντος περιέχουν:

Δραστικό συστατικό: 2,5 g Tiamulin Hydrogen Fumarate 80% (ισοδύναμο με 2 g Tiamulin Hydrogen Fumarate)

Έκδοχο: Maize Starch

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Το TIAMUVET® premix 2% ενδείκνυται για την πρόληψη και τη θεραπεία των μυκοπλασματικών λοιμώξεων των χοίρων (ενζωτική πνευμονία, πλευροπνευμονία, δυσεντερία και λεπτοσπείρωση).

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χρησιμοποιείται σε κάπρους ή εγκυμονούσες σύες με εξαίρεση την περίοδο των 4 εβδομάδων πριν και των 4 εβδομάδων μετά τον τοκετό.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Κατά τη χρήση αντιβιοτικών θα πρέπει να προσεχθεί η αύξηση των μη ευαίσθητων μικροοργανισμών και μυκήτων. Μπορεί να εμφανισθεί ερύθημα στο δέρμα των χοίρων.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Χοίροι

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το TIAMUVET® premix 2% αναμειγνύεται με το τελικό φύραμα στις εξής δόσεις:

	ΕΝΖΩΟΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ	ΔΥΣΕΝΤΕΡΙΑ	ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΠΡΟΛΗΨΗ	200 ppm δραστικής ή 10 kg προϊόντος/ τόνο για 5 ημέρες και στη συνέχεια 2 kg προϊόντος/ τόνο για 6 εβδομάδες	40 ppm δραστικής ή 2 kg προϊόντος/ τόνο για 2-3 εβδομάδες σε περιόδους αυξημένου stress (απογαλακτισμός-ομαδοποιήσεις)	
ΘΕΡΑΠΕΙΑ	200 ppm δραστικής ή 10 kg προϊόντος/ τόνο για 10 μέρες και στη συνέχεια 2 kg προϊόντος/ τόνο για 2-3 εβδομάδες	100-150 ppm δραστικής ή 5-7,5 kg προϊόντος/ τόνο για 7-10 ημέρες και στη συνέχεια 2 kg προϊόντος/ τόνο για 2-3 εβδομάδες	200 ppm δραστικής ή 10 kg προϊόντος/ τόνο για 10 ημέρες

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Να μη χορηγείται ταυτόχρονα με ιονοφόρα (πολυαιθέρες), όπως μονενσίνη (monensin), σαλινομυκίνη (salinomycin), μαδοραμικίνη (maduaramycin) και ναρκίνη (narasin), γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρή καταστολή της ανάπτυξης ή ακόμη και θάνατο.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας: 14 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C, προστατευμένο από το φως.
Διάρκεια ζωής μετά την ανάμιξη στη ζωοτροφή: 1 μήνας

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Κατά τη χρήση αντιβιοτικών θα πρέπει να προσεχθεί η αύξηση των μη ευαίσθητων μικροοργανισμών και μυκήτων. Εάν μέσα σε διάστημα 5 ημερών δε διαπιστωθεί θεραπευτικό αποτέλεσμα, θα πρέπει η διάγνωση να επανεκτιμηθεί. Κατά την ανάμιξή του με την τροφή, TIAMUVET® premix 2% να μην έρχεται σε επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κουτί των 5 kg

Σάκος των 20 και 25 kg

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 44150/01/10-04-2002/Κ-0142901

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777