

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

TAD VIT-E® oral solution
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:

PROVET A.E.

Λεωφ. Ποσειδώνος 77

174 55 Άλμιος, Αττική

Τηλ.: +30 2105575770-3

+30 2105508500

Fax: +30 2105575830

E-mail: vet@provet.gr

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
TAD VIT-E® oral solution

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Τα 100 ml διαλύματος περιέχουν:

Δραστικό συστατικό: 10 g Vitamin E acetate

Έκδοχα: Cremophor EL, Glycerin, Butylated hydroxyanisole, Methyl parahydroxybenzoate, Propyl parahydroxybenzoate, Purified water

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Ιπποειδή-Βοοειδή-Πρόβατα-Αίγες-Χοίροι-Σκύλος-Γάτα: το TAD VIT-E® συνιστάται σε περιπτώσεις, όπως υπογονιμότητα αρσενικών και θηλυκών, καθ' ἑξιν αποβολή, oligospermia, διαταραχές της αναπαραγωγής, μυϊκή δυστροφία και μυοπάθειες οφειλόμενες σε ανεπάρκεια της βιταμίνης E.

Πτηνά: το TAD VIT-E® ενδείκνυται για περιπτώσεις, όπως χαμηλή εκκολαψιμότητα, περιορισμένη ωοπαραγωγή, εγκεφαλομαλάκυνση, εξιδρωματική διάθεση των ορνίθων και ενζωοτική μυϊκή δυστροφία σε παπάκια και χηνάκια, που οφείλονται σε ανεπάρκεια της βιταμίνης E.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν έχουν αναφερθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Ιπποειδή, Βοοειδή, Πρόβατα, Αίγες, Χοίροι, Σκύλος, Γάτα, Πτηνά

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Χορηγείται από το στόμα διαλυμένο στο πόσιμο νερό ή αναμιγμένο με την τροφή. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη σοβαρότητα του περιστατικού. Γενικά, συνιστώνται οι ακόλουθες δόσεις ημερησίως.

Ιπποειδή-Βοοειδή: 3-5 ml/ ζώο

Μόσχοι-Πώλοι: 2-3 ml/ ζώο

Χοίροι αναπαραγωγής: 3 ml/ ζώο

Χοίροι-Πρόβατα-Αίγες: 2 ml/ ζώο

Σκύλος-Γάτα: 1 ml/ ζώο

Πτηνά: χορηγούνται 100 ml την ημέρα σε 1500 ορνίθια ή 700 πουλάδες ή 500 ωστόσο όρνιθες επί 3 ημέρες στο πόσιμο νερό. Αρχικά διαλύονται 100 ml σε 10 L νερού και το διάλυμα αυτό προστίθεται στο πόσιμο νερό.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Καμία

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 0 ημέρες

Γάλα: 0 ημέρες

Αυγά: 0 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25 °C.

Διάρκεια ζωής μετά την ανασύσταση σύμφωνα με τις οδηγίες: 24 ώρες

Όταν ανοιχτεί η φιάλη, να χρησιμοποιείται αμέσως το περιεχόμενο.

12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)

Καμία

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

14. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιάλη των 250 ml

Φιάλη των 1000 ml

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας: 6788/28-01-2011/Κ-0042901

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.

χορηγείται με συνταγή κτηνιάτρου

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793.777